

## 治癒証明書

つみき保育園・園長殿

園児氏名

病名 [ ]

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので、  
登園可能と認めます。

令和 年 月 日

医療機関名

医師名

㊞

## 医療機関が記入した治癒証明書が必要な感染症

病名	最も感染しやすい時期	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症 1 日前から発疹出現後 4 日後まで	発熱後 3 日を経過してから
インフルエンザ	発症 24 時間前から後 3 日が最も多い (ウイルス量は減少していくが 1 週間は注意が必要)	発熱後 5 日間及び解熱後 3 日を経過してから
風疹	発疹出現の前 7 日から後 7 日間くらい	発疹が消失してから
水痘（水ぼうそう）	発疹出現 1～2 日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふく)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発 現してから 5 日を経過するまで、か つ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認め るまで
咽頭結膜熱（ﾌﾟｰﾙ熱） ｱﾀﾞ ｲﾝﾌﾙ (3.4.7.11 型)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え 2 日経過してから
流行性角結膜炎（はやり目） ｱﾀﾞ ｲﾝﾌﾙ (8.19.37 型)	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が 消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週 間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は 5 日 間の適正な抗菌性物質製剤による 治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111 等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了 し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、 いずれも菌陰性が確認されてから
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1～2 週間、便か ら数週間～数ヶ月排出される	医師により感染の恐れがないと認め るまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認め るまで

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について「治癒証明書」の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能なお状態となつてからの登園であるようご配慮ください。